

## Дженерик Super P-Force – Инструкция

### Рекомендуемая дозировка и способ применения:

Применяется лекарство внутрь и обязательно его нужно запить стаканом воды, раз в сутки, примерно за час до того, как вы приступите к половому акту. Действие препарата «Super P-Force» помогает только при условии наличия сексуальной стимуляции.

Наибольший эффект активности данного вещества приобретается приблизительно через пол часа после его применения. Не рекомендуется употреблять в это время алкоголь или жирную пищу, так как они затормаживают действие силденафила приблизительно на час.

Действие силденафила цитрата длится около четырех часов. А эффект дапоксетина может сохраняться и до 15 часов.

Максимальная рекомендуемая доза дапоксетина составляет 60 мг 1 раз/сут.

Максимальная рекомендуемая доза силденафила составляет 100 мг 1 раз/сут.

### Противопоказания:

Препарат «Super P-Force» нужно принимать аккуратно и учитывать те случаи, при которых его потребление полностью противопоказано:

Пигментный ретинит;

Гипотония или гипертония;

Лейкемия;

Ишемическая болезнь сердца;

Злокачественная анемия (болезнь Аддисона);

Заболевания сердечно-сосудистой системы;

Множественная миелома;

Сердечная недостаточность;

Искривление полового члена.

### Побочные эффекты «Super P-force» :

К сожалению эти два активных вещества дапоксетин и силденафил цитрат могут негативно сказаться на вашем организме. Как правило, побочные явления проходят быстро и могут переходить от одних симптомов к другим.

### Самые распространенные побочные эффекты силденафила цитрата:

Головная боль;

Длительная эрекция;

Чиханье;

Учащенное сердцебиение;

Светобоязнь (фотофобия).

### Побочные эффекты дапоксетина:

Тошнота;

Головная боль;

Головокружение.