

СИЛДЕНАФИЛ ДЛЯ ЖЕНЩИН инструкция



Силденафил для женщин производится под марками: Womenra, Femalegra, Ladygra или Cenforce FM

Состав: Активным компонентом Womenra/Femalegra/Ladygra/Cenforce FM является силденафила цитрат (Sildenafil Citrate), который содержится в таблетках в дозах, эквивалентных 50 мг или 100 мг силденафила.

Перечень неактивных компонентов

Микрокристаллическая целлюлоза, кальция гидрофосфат (безводный), натрия кроскармеллоза, магния стеарат, опадрай розовый*

* – опадрай розовый содержит: лактоза, гипромеллоза, титана диоксид (E171), триацетин, краситель железа оксид красный (E172).

Показания к применению препарата Womenra

Повышение сексуальности, усиление чувствительности к стимуляции. Негормональный препарат.

Режим дозирования и способ применения: Таблетки Womenra принимают внутрь.



Применение у взрослых

- Рекомендуемую дозу 50 мг принимают при необходимости примерно за один час до планируемой сексуальной активности.
- С учетом эффективности и переносимости доза может быть увеличена до 100 мг или снижена до 25 мг.
- Максимальная рекомендуемая доза составляет 100 мг.
- Максимальная рекомендуемая частота применения – один раз в день.

Применение у пожилых людей и больных с нарушенной функцией почек или печени

- У пожилых людей и больных с нарушенной функцией почек или печени рекомендуемая схема применения та же.

Применение у детей

- Силденафил для женщин не следует назначать детям.

Безопасность использования силденафила в следующих подгруппах пациентов не изучалась, и, поэтому, его использование в них противопоказано до получения дальнейшей информации: трудная печеночная недостаточность, гипотензия (артериальное давление < 90/50 мм рт. ст.), недавно перенесенный инсульт или инфаркт миокарда и наследственные дегенеративные заболевания

сетчатки, такие как пигментация сетчатки (небольшое количество таких пациентов имеют генетические нарушения фосфодиэстеразы сетчатки).

Противопоказания:

Силденафил противопоказан больным с гиперчувствительностью к любому компоненту таблетки. Благодаря известному влиянию на обмен окиси азота/цГМФ, Силденафил усиливал гипотензивное действие нитратов, поэтому его применение противопоказано у больных, получающих донаторы окиси азота или нитраты в любых формах. Препарат Womengra/Femalegra/Ladygra запрещен к использованию во время беременности.

Особые предостережения и особые меры предосторожности:

Силденафила цитрат, активный компонент Womengra, может оказывать негативное воздействие на организм при миоме матки. Поэтому, в случае миомы матки, лечащий врач (эндокринолог/гинеколог) должен разрешить или запретить прием препарата индивидуально.

Побочные эффекты

В клинических исследованиях переносимость Womengra была хорошей. В плацебоконтролируемых клинических исследованиях частота прекращения терапии из-за нежелательных явлений была низкой и сопоставимой с таковой при приеме плацебо. Нежелательные явления обычно были преходящими и легкими или умеренно выраженными.

В клинических исследованиях, с индивидуальным подбором доз, чаще всего встречались следующие нежелательные явления, связь которых с приемом препарата была возможной, вероятной или неизвестной:

- сердечно-сосудистые – головная боль, приливы, головокружение;
- пищеварение – диспепсия;
- дыхание – заложенность носа;
- органы чувств – изменение зрения (легкое и преходящее; главным образом изменение цвета объектов, а также усиленное восприятие света и нарушение четкости зрения).
- При использовании препарата в дозах, превышавших рекомендуемые, нежелательные явления были сходными с отмеченными выше, но обычно встречались чаще.

Влияние на способность управлять автомобилем и пользоваться техникой: При управлении автомобилем или механизмами специальные меры предосторожности не требуются.

Срок годности: 2 года.

Условия хранения: Хранить при температуре ниже 30°C. Хранить в недоступном для детей месте.